

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

# Baroque

- 1. Nombre del Producto:**
- 2. Clasificación del Producto:** ACARICIDA
- 3. Ingredientes Activos:** (Ingrediente + Contenido)  
ETOXAZOLE 110 g/l
- 4. Grupo Químico:** Derivado de Difeniloxazoline
- 5. Usos:** AGUACATE, NARANJA (Limón,  
Mandarina,  
ORNAMENTALES  
Lima, Tangelo, Toronja),  
(ROSA)
- 6. Categoría Toxicológica:** III - Ligeramente Peligroso - Cuidado
- 7. Formulación:** SUSPENSIÓN CONCENTRADA
- 8. Registro Nacional ICA:** 2080
- 9. Empresa Titular Registro:** Valent Biosciences LLC
- 10. Presentaciones:** BOTELLA PADE DE 100 cc, 500 cc, 1 Litro

**11. Mecanismo de Acción:**

Etoxazole interfiere la normal actividad de la hormona juvenil "JH" por lo tanto causa detenimiento de la alimentación e inhibe el crecimiento de estados inmaduros causando la muerte a nivel de muda. Reduce la oviposición en hembras tratadas.

**12. Modo de Acción:**

Etoxazole actúa como regulador del crecimiento, por contacto e ingestión sobre ácaros e insectos. Posee actividad Translamina. Su acción es efectiva sobre huevos, larvas y ninfas de los ácaros a muy bajas dosis, no tiene ningún efecto sobre adultos.

### 13. Apariencia:

Líquido blanco grisáceo

### 14. Recomendaciones de Uso:

CULTIVO	DOSIS	Blanco biológico a controlar	P.C	P.R
Aguacate ( <i>Persea americana</i> )	0,3 cc/L 600 L/Ha de agua	Acaro <i>Oligonychus yothersi</i>	7 días*	12 horas**
Naranja*** ( <i>Citrus sinensis</i> )	0,3 cc/L 600 L/Ha de agua	Acaro <i>Phyllocoptruta oleivora</i>	7 días*	12 horas**
Limón ( <i>Citrus aurantifolia</i> )				
Mandarina ( <i>Citrus reticulata</i> )				
Lima ( <i>Citrus limetta</i> )				
Tangelo ( <i>Citrus paradisi</i> )				
Toronja ( <i>Citrus paradisi</i> )				

USO ORNAMENTALES****				
CULTIVO	DOSIS	Blanco biológico a controlar	P.C	P.R
Ornamentales (Rosa)	0.3 a 0.45 cm <sup>3</sup> /L (dependiendo de la presión del ácaro)	Acaros ( <i>Tetranychus urticae</i> )	N.A.	4 horas

**P.C: Período de carencia:** Intervalo de tiempo entre última Aplicación y la Cosecha.

\*Este límite fue establecido para un límite máximo de 0.02 ppm para Etoxazole. Para efectos de exportación revisar la regulación de límites máximos de residuos para el país destino.

**PR: Periodo de reentrada: REI:** Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas al área o cultivo tratado. En caso de ser necesario el ingreso antes del tiempo determinado como periodo de reentrada, se debe usar pantalón largo, camisa manga larga, calzado cerrado y para las labores que impliquen contacto de las manos con el área tratada, se debe usar adicionalmente guantes.

\*\*De acuerdo a la Resolución ICA No. 4754 del 7 de diciembre del 2011

\*\*\*En las evaluaciones de fitotoxicidad hechas a los cultivos de Pompón (Goolden Polaris), Clavel (Bize†) y Rosa (Freedom) no se observaron daño o efecto Fitotóxico"

### 15. Frecuencia y Época de Aplicación

Ornamentales El uso de BAROQUE 110 SC debe estar contemplado dentro de un programa de rotación de Acaricidas e insecticidas de acuerdo a su mecanismo de acción, siguiendo las recomendaciones del Comité de Prevención de Resistencia a Insecticidas (IRAC) y dentro de un plan de manejo integrado de plagas. Realice una sola aplicación con los primeros síntomas de daño o con la presencia de la plaga. Se recomienda hacer el monitoreo directo por semana en el cultivo, para realizar la aplicación, ya que el hábito agregado de la plaga, la magnitud del daño

y distribución en el cultivo determina la forma de una aplicación general o en focos.

#### **16. Equipos y volumen de mezcla.**

BAROQUE 110 SC se puede aplicar con los equipos terrestres de uso común. Siempre calibre el equipo de aplicación, agregue las dosis recomendadas en la mitad de agua requerida para su aplicación, agite y adicione la cantidad de agua restante. Mantenga la mezcla en agitación una vez el producto es mezclado con agua. La mezcla debe ser aplicada en mismo día, evite utilizarla de un día para otro. Utilice un volumen de agua de 1000 L/ha en ornamentales.

#### **17. Compatibilidad y fitotoxicidad.**

Es indispensable realizar previamente un ensayo de compatibilidad cuando se desee usar BAROQUE 110 SC con insecticidas o fungicidas. BAROQUE 110 SC no es fitotóxico cuando se aplica en las dosis y cultivos recomendadas en esta etiqueta.

**Categoría Toxicológica: III (Ligeramente Peligroso - Cuidado)**

**Lea la etiqueta antes de usar el producto. Plaguicida. Consulte con su Ingeniero Agrónomo. ®Marca Registrada de Sumitomo Chemical Co. Ltd.**

*Formulado por: Sumitomo Chemical Co. Ltd.  
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku,  
Tokyo 104-8260  
Japón*

*Importado y Distribuido por SUMMIT AGRO COLOMBIA S.A.S.  
Carrera 7 # 127 – 48, oficina 808. Tel.: (571) 5140407  
Bogotá, D. C. Colombia.*