

MONCUT® 20 SC

SUSPENSIÓN CONCENTRADA

Fungicida Agrícola

Código: FT-CO-FLU Versión: 01

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente activo:


Flutolanil 20%

 α,α,α -trifluoro-3'-isopropoxy-o-toluanilide

Ingredientes aditivos: c.s.p. 1 Litro

CARACTERÍSTICAS:

MONCUT® 20 SC es un fungicida sistémico, con acción protectante y curativa, recomendado para el control de Rhizoctonia en el cultivo de arroz, alstroemeria y papa. Debido a su actividad sistémica, tiene un efecto prolongado en la planta.

GENERALIDADES	
Ingredientes activos	Flutolanil
Nombre Químico (IUPAC)	α,α,α -trifluoro-3'-isopropoxy-o-toluanilide
Formulación	Suspensión concentrada SC
Concentración	20%
Nombre Comercial	MONCUT® 20 SC
Formula Estructural	
Formula Empírica	C ₁₇ H ₁₆ F ₃ NO ₂
Grupo Químico	Fenil benzamidas
PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN	
Estado Físico	Suspensión blanquecina
Explosividad	No explosivo
Densidad de la formula	1.05 g/mL

MONCUT® 20 SC

SUSPENSIÓN CONCENTRADA

Fungicida Agrícola

Código: FT-CO-FLU Versión: 01

TOXICOLOGIA:

Categoría toxicológica III: Medianamente toxico

Precauciones y advertencias de uso y aplicación

- **El producto causa irritación moderada a los ojos.**
- Nocivo si es ingerido o inhalado.
- Utilizar ropa de protección adecuada al manipular, aplicar el producto y para ingresar al área tratada (guantes, botas, visor, overol).
- **Este producto puede ser mortal si se ingiere.**
- **No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.**
- **Después de aplicar el producto báñese con abundante agua y jabón, lave la ropa contaminada.**
- No permita animales en el área tratada.
- Los equipos de aplicación deben ser previamente calibrados.
- **Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No re-envase el producto.**
- No almacenar en casas de habitación. Almacene el producto en sitios seguros, retirados de alimentos y medicinas de consumo humano y animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco, seco y ventilado).
- Transpórtelo solamente con productos agroquímicos, NO con productos de consumo humano y animal.

Medidas de Primeros Auxilios

Contacto ocular: Lave los ojos afectados durante varios minutos. Si la irritación persiste, consulte a un médico.

Contacto dermal: Retire la ropa contaminada. Enjuague y luego lave el área afectada con agua y jabón. Lave la ropa contaminada antes de volverla a usar. Si la irritación persiste, consulte a un médico.

Ingestión: Si es ingerido, lave la boca con agua y proporcione uno a dos vasos de agua para ser tomada. Mantenga al paciente en reposo mientras consiga asistencia médica. No inducir el vómito.

Inhalación: Lleve a un lugar con aire fresco. Consiga asistencia médica si observa efectos adversos.

MONCUT® 20 SC

SUSPENSIÓN CONCENTRADA

Fungicida Agrícola

Código: FT-CO-FLU Versión: 01

RECOMENDACIONES DE USO:

MONCUT® 20 SC es un fungicida sistémico, con acción protectante y curativa, recomendado para el control de *Rhizoctonia* en el cultivo de arroz, alstroemería y papa. Debido a su actividad sistémica, tiene un efecto prolongado en la planta.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	P.C	P.R
Arroz	<i>Rhizoctonia solani</i>	1.5 L/ha	14	4
Papa	<i>Rhizoctonia solani</i>	1.5 L/ha	14	4
Alstroemería	<i>Rhizoctonia sp</i>	1 cc/L de agua	NA	4

P.C: Período de carencia: Intervalo de tiempo entre última Aplicación y la Cosecha.

PR: Período de reentrada: REI: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas al área o cultivo tratado. En caso de ser necesario el ingreso antes del tiempo determinado como período de reentrada, se debe usar pantalón largo, camisa manga larga, calzado cerrado y para las labores que impliquen contacto de las manos con el área tratada, se debe usar adicionalmente guantes.

En arroz se pueden realizar dos aplicaciones así: Aplicación temprana durante el macollamiento (aprox 35 DDE). Aplicación tardía: Durante embuchamiento (aprox 75 DDE). En el cultivo de papa, realizar aplicaciones al momento de la siembra deshierbe y el aporque. En alstroemería para aplicación en Drench, hacer dos aplicaciones, una al momento del trasplante y la segunda 15 días después de este.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Antes de efectuar mezclas debe realizarse previamente pruebas de compatibilidad (miscibilidad) y fito-compatibilidad con el producto que se desea mezclar.

Agitar bien el producto antes de usarlo. Llenar el tanque de mezcla hasta la mitad, agregar la cantidad indicada de **MONCUT® 20 SC** y completar el volumen con agua. Mantener la agitación durante la aplicación.

Registro ICA: 2121

Categoría toxicológica: III

Medianamente Peligroso

ETIQUETA AZUL

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO:

SUMMIT AGRO COLOMBIA S.A.S.

Carrera 7 # 127 – 48, oficina 808, Edificio Centro Empresarial 128.

Teléfono: (601) 5140407. Bogotá, D. C. Colombia.