

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



1. Empresa Titular: SUMMIT AGRO COLOMBIA S.A.S.
2. Nombre del Producto: MERIT AMARILLO
3. Clasificación del Producto: FERTILIZANTE DE APLICACIÓN FOLIAR
4. Composición y Concentración

NUTRIENTE	CONCENTRACIÓN	
	Gramos/Litro (g/L)	Porcentaje peso/peso (p/p)
NITRÓ GENO TOTAL (N)	36.3	3.0 %
Nitrógeno Amoniacal (N)	24.2	2.0 %
Nitrógeno Nítrico (N)	12.1	1.0 %
FÓ SFORO ASIMILABLE (P ₂ O ₅)	84.7	7.0 %
POTASIO SOLUBLE EN AGUA (K ₂ O)	72.6	6.0 %
BORO (B)	0.75	0.06 %
COBRE (Cu)	0.61	0.05 %
HIERRO (Fe)	0.97	0.08 %
MANGANESO (Mn)	0.85	0.07 %
MOLIBDENO (Mo)	0.85	0.07 %
ZINC (Zn)	0.61	0.05 %
pH en solución al 10 % = 6,9		
Densidad a 20 °C = 1,21 g/ml		

5. Grupo Químico: FERTILIZANTE FOLIAR
6. Usos registrados: Arroz, Algodón, Rosas, Maíz y Café
7. Categoría Toxicológica: No Requiere
8. Formulación: Concentrado Soluble
9. Registro de Venta ICA: 3143

10. Presentaciones:

botella plástica de 1L, garrafa plástica de 5L, caja de cartón rígido con bolsa plástica interna por 16.5L de contenido neto.

11. Mecanismo de Acción:

El Ácido Polifosfórico (AP), principal componente y matriz de formulación de MERIT AMARILLO, es asimilado muy rápido a través de la cutícula del tejido verde. Este AP es la fuente orgánica quelatante de los elementos menores para rápido transporte, asimilación y biodisponibilidad.

12. Modo de Acción:

Fertilizante foliar y activador energético de las células, es traslocado rápidamente a todos los tejidos verdes para activar los diferentes procesos metabólicos y enzimáticos, indispensables para la supervivencia, crecimiento y desarrollo de los cultivos.

13. Apariencia:

LÍQUIDO VERDE

14. Recomendaciones de Uso:

CULTIVO	*DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
ROSA	3 cm ³ / l de agua	3 semanas después de poda 4 semanas después de poda 5 semanas después de poda
ARROZ	0.75 l/ha	- Inicio de macollamiento. - Aproximadamente 40 días después de germinación - Pleno embuchamiento. - Aproximadamente 60 días después de germinación
ALGODÓN	0.75 l/ha	60 días después de germinación 75 días después de germinación 90 días después de germinación
MAIZ	1.25 l/ha	45 días después de germinación
CAFE	1.25 l/ha	15 días antes de diferenciación floral o con flor en "Puntilla"

* Dosis por aplicación

El uso de MERIT AMARILLO en las dosis y épocas recomendadas, contribuye a mejorar los rendimientos en cultivos de:

- PAPA, incrementando el peso y número de tubérculos tamaño "primera".
- MAIZ, aumentando el peso y número de granos llenos por mazorca.
- CAFÉ, incrementando el número de flores por rama.

De acuerdo con los resultados de eficacia, ejecutados bajo supervisión de la ANC – ICA.

PRECAUCIONES Y COMPATIBILIDAD

Las mezclas de productos agroquímicos, fertilizantes o reguladores fisiológicos efectuados con **MERIT AMARILLO**, deben ser probadas previamente en cantidades y áreas pequeñas para confirmar su compatibilidad. Dichas mezclas siempre deben ser usadas inmediatamente después de su preparación y no deben ser conservadas de un día para otro.

15. Período de Reentrada: No aplica

Lea la etiqueta antes de usar el producto. Consulte con su Ingeniero Agrónomo. ®Marca Registrada SEIKAKEN INC.

***Importado y Distribuido por SUMMIT AGRO COLOMBIA S.A.S.
Calle 99 # 9 A 45, Oficina 301 A y 305 A. Tel.: (601) 5140407
Bogotá, D. C. Colombia.***